

Detalii Produs		
Nume produs :	AIRONE SC	
Stare :	Omologat	
Grupă de toxicitate :	3	
Comentariu (motiv retragere) :		
Tip formulare :	SC - Suspensie concentrata	
Categorie :	1. Fungicide	
Clasă :	A. Anorganice	
Număr cerere, dată:	160765, 17/06/2014	
Număr certificat, dată:	376PC, 28/02/2018	
Data expirare certificat:	01/01/2023	
Detinator(i) omologare:	GOWAN CROP PROTECTION LIMITED, MAREA BRITANIE	

Substanțe active

Nume substanță :	Valoare	u.m.
cupru	272	g/l

Fraze de risc și siguranță

Frază	Categorie
--------------	------------------

Utilizări

Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Cais	Boli	Basicarea frunzelor, hrlupii, ciuruirea frunzelor, monilioza	4,0 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91) si prim	21 zile	-
Cartof	Boli	Mana carofului, alternarioza	3,0 L/ha se aplica la aparitia simptomelor, de la a 5-a frunza p	7 zile	-
Cires	Boli	Basicarea frunzelor, hrlupii, ciuruirea frunzelor, monilioza	4,0 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91) si prim	21 zile	-
Flori	Boli	Mana, cercosporioza, putregaiul, rugina, arsura bacteriana	2,78 L/ha se aplica la aparitia simptomelor in toate stadiile de	-	-
gutui	Boli	Cancerul deschis al pomilor, focul bacterian, patarea bacteriana a frunzelor, putregaiul negru	3,0 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si p	21 zile	-
gutui	Boli	Rapan	2,5 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si p	21 zile	-
Hamei	Boli	Mana	7,35 L/ha se aplica de la sfarsitul cresterii conurilor pana la	14 zile	-
Mar	Boli	Rapan	2,5 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor	21 zile	-

			(BBCH 91-97) si p		
Mar	Boli	cancerul deschis al pomilor, focul bacterian, patarea bacteriana a frunzelor, putregaiul negru	3,0 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si p	21 zile	-
Nectarin	Boli	Monilioza, basicarea frunzelor	3,5 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91)si prima	21 zile	-
Par	Boli	Cancerul deschis al pomilor, focul bacterian, patarea bacteriana a frunzelor, putregaiul negru	3,0 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si p	21 zile	-
Par	Boli	Rapan	2,5 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91-97) si p	21 zile	-
Piersic	Boli	Monilioza, basicarea frunzelor	3,5 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91)si prima	21 zile	-
Piersic pentru industrializare	Boli	Monilioza, basicarea frunzelor	3,5 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91)si prima	21 zile	-
plante ornamentale	Boli	Mana, cercosporioza, putregaiul, rugina, arsura bacteriana	2,78 L/ha se aplica la aparitia simptomelor in toate stadiile de	-	-
Prun	Boli	Basicarea frunzelor, hrlupii, ciuruirea frunzelor, monilioza	4,0 L/ha se aplica toamna la caderea frunzelor (BBCH 91) si prim	21 zile	-
Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie, putregaiul negru, patarea rosie a frunzelor	2,5 L/ha se aplica preventiv, de la a 3-a frunza pana la inceput	21 zile	-

MRL		
Definiție Rezinuuri	Produs Vegetal	MRL