

Detalii Produs

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nume produs : | AVOXA |
| Stare : | Omologat |
| Grupă de toxicitate : | 3 |
| Comentariu (motiv retragere) : | |
| Tip formulare : | EC - Concentrat emulsionabil |
| Categorie : | 7. Erbicide |
| Clasă : | A. Ariloxiacizi |
| Număr cerere, dată: | 1268, 30/01/2020 |
| Număr certificat, dată: | 661PC, 24/11/2020 |
| Dată expirare certificat: | 30/04/2025 |
| Detinator(i) omologare: | Syngenta Agro SRL, ROMANIA |

Substanțe active

| Nume substanță : | Valoare | u.m. |
|-------------------------|----------------|-------------|
| piroxsulam | 8,33 | g/l |
| pinoxaden | 33,3 | g/l |
| Cloquintocet-mexil | 8,33 | g/l |

Fraze de risc și siguranță

| Frază | Categorie |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

Utilizări

| Cultură RO | Agent Dăun. | Nume RO | Doză | Pauză | Nr.Trat. |
|---------------------|--------------------|--|--|--------------|-----------------|
| Grau de toamna | Buruieni | Alopecurus myosuroides (Coada vulpii); Bromus spp. (Obsiga secarei); Galium aparine (Lipicioasa) | 1,8 L/ha Se aplica postemergent, de la prima frunza vizibila pan | - | - |
| Grau de toamna | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale, Apera spica-venti (Iarba vantului); Lolium spp. (Reigras) | 1,35 L/ha Se aplica postemergent de la prima frunza vizibila pan | - | - |
| Secara de toamna | Buruieni | Alopecurus myosuroides (Coada vulpii); Bromus spp. (Obsiga secarei); Galium aparine (Lipicioasa) | 1,8 L/ha Se aplica postemergent, de la prima frunza vizibila pan | - | - |
| Secara de toamna | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale, Apera spica-venti (Iarba vantului); Lolium spp. (Reigras) | 1,35 L/ha Se aplica postemergent de la prima frunza vizibila pan | - | - |
| Triticale de toamna | Buruieni | Alopecurus myosuroides (Coada vulpii); Bromus spp. (Obsiga secarei); Galium aparine (Lipicioasa) | 1,8 L/ha Se aplica postemergent, de la prima frunza vizibila pan | - | - |
| Triticale de toamna | Buruieni | Buruieni dicotiledonate anuale, Apera spica-venti (Iarba vantului); Lolium spp. (Reigras) | 1,35 L/ha Se aplica postemergent de la prima frunza vizibila pan | - | - |

MRL

| | | |
|---------------------|----------------|-----|
| Definiție Reziduuri | Produs Vegetal | MRL |
|---------------------|----------------|-----|