



# BUTOXONE M40 erbicid



## BUTOXONE M40®

Conține: 400 g/l MCPB-Na  
Omologat în România cu certificat de omologare nr. 1587/27.04.1995



### Proprietăți fizico-chimice

Butoxone M 40 este un lichid limpede, omogen, mobil, de culoare brună, cu un conținut în MCPB-Na de 400 g/l.



### Mod de acțiune

Butoxone M 40 este un erbicid sistemic ce se absoarbe prin frunze și, parțial, prin rădăcini. Produsul pătrunde cu rapiditate în plantă, concentrându-se în meristeme (zone de creștere intensă a plantelor prin diviziune rapidă și alungirea celulelor).

Mecanismul de combatere al buruienilor se bazează pe dereglarea dezvoltării celulare și afectarea procesului de respirație.



### Recomandări de utilizare

Produsul este omologat conform tabelului de mai jos:

Cultura	Buruieni combătute	Doza
Mazăre	Buruieni dicotiledonate anuale (buruieni în faza de 2 - 4 frunze) și dicotiledonate perene (buruieni în faza de <10 cm) (mazărea 10 - 12 cm înălțime)	2 – 4,5 l/ha Se aplică postemergent, când cultura are 3 noduri, de la faza de 3 frunze complet desfăcute până înainte de faza de buton floral

Butoxone M 40 trebuie aplicat atunci când cultura de mazăre este în creștere activă, plantele având 10 – 12 cm înălțime. Rezultatele cele mai bune se obțin dacă în momentul aplicării tratamentului buruienile sunt răsărite în număr mare și sunt în faza de 2 – 4 frunze.

Se recomandă aplicarea dozei de 2-2,5 l pentru tratamentele efectuate în perioada optimă de aplicare. Erbicidarea se va face până la apariția butonilor floralii. Aplicarea mai târzie poate să ducă la reducerea producției. Dacă seceta afectează cultura, pot apărea fenomene de distorsionare a plantelor de cultură sau distrugerea unor părți ale acestora. Se aplică o singură erbicidare cu Butoxone M 40 pe cultură per sezon.



### Buruieni combătute

Buruieni foarte sensibile:

- *Brassica nigra* (muștarul negru); - *Rumex spp.* (măcriș); - *Cirsium arvense* (pălămida);
- *Chenopodium album* (spanac sălbatic); - *Thlaspi arvense* (pungulița); - *Plantago spp.* (pătlagina);
- *Capsella bursa-pastoris* (traista ciobanului); - *Urtica urens* (urzica mică).



### Important

- Nu prelucrați solul timp de 10 zile de la aplicarea tratamentului;
- Se va evita erbicidarea pe vreme rece sau secetoasă;
- Nu se va aplica produsul în condiții de vânt puternic pentru a evita driftul;
- Nu se va erbicida mazărea pentru sămânță.



WWW.NUFARM.RO



Grow a better tomorrow