

Regiunea Vest

Marius Farcaș - Regional Manager - 0722.297.513

Vest 1 - Adrian Milășan - Sales Representative - 0732.711.230 (CJ, BN, MS, HR, AB, SB, BV, CV)

Vest 2 - Marius Magopăț - Sales Representative - 0732.674.862 (AR)

Vest 3 - Sorin Cîrstea - Sales Representative - 0733.107.470 (HD, TM, CS)

Vest 4 - Zsolt Veres - Sales Representative - 0728.134.236 (BH, SM, MM, SJ)

Regiunea Est

Gheorghe Neagu - Regional Manager - 0727.707.564

Est 1 - Mihai Rusu - Sales Representative - 0726.123.428 (BT, SV, NT)

Est 2 - Alin Alici - Sales Representative - 0731.490.876 (IS, VS, BC, VN)

Regiunea Sud VEST

Constantin Socol - Area Manager - 0730.166.692

Sud Vest 1 - Nicoleta Bălă - Sales Representative - 0726.266.155 (DJ, MH, GJ, VL)

Sud Vest 2 - Liviu Dincă - Sales Representative - 0729.806.362 (TR, OT, AG)

Sud Vest 3 - Diana Albu - Sales Representative - 0728.999.959 (GR, DB)

Regiunea Sud EST

Octavian Jitea - Regional Manager - 0733.106.367

Sud Est 1 - Adrian Iordache - Sales Representative - 0726.326.339 (CL, IF)

Sud Est 2 - Cristian Gherunda - Sales Representative - 0732.750.468 (IL, PH)

Sud Est 3 - Liviu Oanea - Sales Representative - 0727.736.018 (BR, BZ)

Sud Est 4 - Vasile Stoica - Sales Representative - 0730.166.691 (CT, TL)

Sud Est 5 - Mihaela Roman - Sales Representative - 0728.999.282 (GL)

BASF SRL

Floreasca Park, Șos. Pipera nr. 43, corp A, sector 2, 014254, București

Tel.: 021 529 90 68/61

Fax: 021 529 90 69

www.agro.basf.ro

Utilizați cu precauție produsele fitosanitare. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol. Informațiile din această broșură sunt de ordin general. BASF SRL nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nicio daună provocată de folosirea informațiilor din această broșură.

Frontier® Forte

“Ferma aceasta va rămâne
moștenire familiei mele.

Cu Frontier® Forte,
mă uit în viitor
 și văd o recoltă bogată.”



BASF
 We create chemistry

Frontier® Forte

720 g/l dimetenamid-P

Frontier® Forte este un erbicid pe bază de dimetenamid-P, din grupa cloroacetamide. Frontier® Forte are o acțiune sistemică, buruienile în curs de germinare absorb substanța activă prin coleoptil, iar cantități foarte mici sunt preluate de rădăcină (traseu secundar). Efectul maxim al erbicidului Frontier® Forte poate fi atins în intervalul de 7-10 zile de la aplicare, produsul este solubilizat în stratul superficial de sol prin intermediul precipitațiilor sau al apei de irigare.



Avantaje

- Eficacitate foarte bună împotriva principalelor buruieni graminee anuale și a unor importante buruieni dicotiledonate
- Selectivitate excelentă
- Efect îmbunătățit de solubilitate ridicată (pentru o bună combatere a buruienilor, dimetenamid-P are nevoie de mai puțină umiditate în comparație cu alte substanțe active care aparțin aceleiași familii chimice)
- Miscibilitate favorabilă
- Dispersie foarte bună în sol
- Permite culturii să răsară fără buruieni
- Datorită efectului rezidual combate și valul doi de buruieni
- Se poate utiliza pentru toate sistemele de lucrări ale solului.



Momentul aplicării

- **Frontier® Forte** este un erbicid de sol cu aplicare în preemergența buruienilor și/sau plantelor cultivate
- În primăverile secetoase, pe soluri cu umiditate insuficientă, se recomandă aplicarea erbicidului înaintea semănatului și incorporarea imediată cu combinatorul (ppi)
- În cazul anilor ploioși și a solurilor cu suficientă umiditate, erbicidul (nu este volatil) poate fi aplicat preemergent (la 1-3 zile după semănat)
- Nu se recomandă aplicarea pe terenuri cu arătură de primăvară.

Frontier® Forte



Secetă

Ppi

încorporare cu combinatorul




Umiditate

Preemergent

aplicare la 1-3 zile după semănat



Modul de folosire

Cultura	Spectrul de combatere	Doza
Floarea-soarelui 	Buruieni monocotiledonate anuale: <i>Setaria spp.</i> (mohor), <i>Echinochloa spp.</i> (iarbă bărboasă), <i>Digitaria spp.</i> (meișor), și unele dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus spp.</i> (știr)	0,8 l/ha (soluri cu 2% humus) 1,2 l/ha (soluri cu 2-3% humus) 1,4 l/ha (soluri cu >3% humus) ppi 3-4 cm (în condiții de secetă), preemergent (în condiții de umiditate)
Cartof 	Buruieni monocotiledonate anuale: <i>Setaria glauca</i> , <i>Setaria viridis</i> (mohor), <i>Echinochloa crus-galli</i> (iarbă bărboasă), <i>Digitaria sanguinalis</i> (meișor) și unele dicotiledonate anuale: <i>Chenopodium album</i> (lobodă porcească), <i>Galinsoga parviflora</i> (busuioc sălbatic), <i>Fagopyrum convolvulus</i> (hrișcă), <i>Stellaria media</i> (rocoină), <i>Amaranthus retroflexus</i> (știr)	0,8 – 1,4 l/ha preemergent 1,4 l/ha pentru culturi infestate cu <i>Solanum nigrum</i> (zârnă), <i>Xanthium italicum</i> (cornaci), <i>Galium aparine</i> (turiță)
Sfeclă de zahăr 	Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate anuale	0,8-1,0 l/ha preemergent (în primăverile secetoase se va aplica ppi cu incorporare 3-5 cm) 1,0 l/ha (pe soluri cu un conținut în humus > 3%)
Porumb 	Buruieni monocotiledonate anuale <i>Setaria spp.</i> (mohor), <i>Echinochloa spp.</i> (iarbă bărboasă), <i>Digitaria spp.</i> (meișor), și unele dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus spp.</i> (știr) și parțial <i>Chenopodium spp.</i> (lobodă porcească)	0,8 l/ha (soluri ușoare - 2% humus) 1,2 l/ha (soluri medii - 2-3% humus) 1,4 l/ha (soluri bogate > 3% humus) ppi 3-4 cm (în condiții de secetă) preemergent (în condiții de umiditate)
Soia 	Buruieni monocotiledonate anuale <i>Setaria spp.</i> (mohor), <i>Echinochloa spp.</i> (iarbă bărboasă), <i>Digitaria spp.</i> (meișor), și unele dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus spp.</i> (știr)	0,8 l/ha (soluri ușoare - 2% humus) 1,2 l/ha (soluri medii - 2-3% humus) 1,4 l/ha (soluri bogate > 3% humus) ppi 3-4 cm (în condiții de secetă) preemergent (în condiții de umiditate)

Atenție!
Referitor la clasificarea produsului: Începând cu data de 01.06.2015, produsele pentru protecția plantelor vor fi clasificate, ambalate și etichetate conform Reg (EC) nr.1272/2008. Pentru informații privind clasificarea produsului vă rugăm să consultați eticheta.